

PROTOCOL DE SALUT

CRITERIS DE NO ASSISTÈNCIA DELS INFANTS A L'ESCOLA BRESSOL DURANT UN PERÍODE DE TEMPS DETERMINAT A CAUSA DE MALALTIES TRANSMISSIBLES.

LES MALALTIES INFECCIOSES QUE ES PODEN TRANSMETRE D'UNA PERSONA A UNA ALTRA PER QUALESVOL MECANISME (MALALTIES TRANSMISSIBLES) SÓN FREQUENTS EN NENS I NENES QUE ASSISTEIXEN A L'ESCOLA.

EN GENERAL NO ÉS NECESSARI QUE S'EXCLOGUIN DE L'ESCOLA QUAN SIGUIN MALALTIES BANALS(EL RISC DE CONTAGI ES POT MINIMITZAR SI SEGUIM LES NORMES HIGIÈNIQUES HABITUALS), LLEVAT QUÈ ES DONI ALGUNA DE LES SEGÜENTS CONDICIONS:

- LA MALALTIA IMPEDEIXI QUE L'INFANT DUGUI A TERME LES SEVES ACTIVITATS AMB NORMALITAT.
- LA MALALTIA REQUEREIXI MÉS ATENCIONS DE LES QUE EL EDUCADOR/A RESPONSABLE DE L'INFANT POT DONAR-LI, REDUINT L'ATENCIÓ ENVERS ALS ALTRES INFANTS.
- L'INFANT PRESENTA: FEBRE, LETARGIA, IRRITABILITAT, PLORA CONSTANTMENT, RESPIRA AMB DIFICULTAT O ALTRES SIGNES QUE EVIDENCIÏN UNA MALALTIA GREU.

HEM DE RECORDAR QUE : EN TOTES LES MALALTIES QUE CURSIN AMB FEBRE, A MÉS DE SEGUIR LES RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES PER A CADASCUNA D'ELLES, CALDRÀ QUE L'INFANT HAGI ESTAT 24 HORES SENSE FEBRE ABANS DE TORNAR A L'ESCOLA BRESSOL.

SI L'INFANT PRESENTA ALGUNA MALALTIA CONTAGIOSA , CAL COMUNICAR-HO A L'ESCOLA PER TAL DE PRENDRE MESURES PREVENTIVES AMB LA RESTA DELS INFANTS ELS QUALS HAGIN ESTAT EN CONTACTE .

MALALTIES DELS ULLS

TIPUS DE MALALTIA	PERÍODE DE NO ASSISTÈNCIA	MESURES ADDICIONALS
CONJUNTIVITIS PURULENTA*	FINS A 24 HORES D'INICIAR EL TRACTAMENT	

MALALTIES RESPIRATÒRIES

TIPUS DE MALALTIA	PERÍODE DE NO ASSISTÈNCIA	MESURES ADDICIONALS
INFECCIÓ RESPIRATÒRIA AGUDA DE VIES ALTES	FINS ALMENYS 24 HORES SENSE FEBRE I TOLERI L'ACTIVITAT GENERAL	
FARINGITIS	FINS A 24 HORES DESPRÉS D'INICIAR EL TRACTAMENT	
AMIGDALITIS VÍRICA	NO ÉS NECESSARI EXCLOURE DE L'ESCOLA SI NO PRESENTA FEBRE.	LA MÉS HABITUAL ÉS LA ORIGINADA PER VIRUS, NO ÉS NECESSARI TRACTAMENT ANTIBIÒTIC
TUBERCULOSI	FINS QUE EL METGE NO DETERMINI QUE NO ÉS INFECCIÓS (MÍNIM 2-3 SETMANES DESPRÉS DE L'INICI DEL TRACTAMENT).	SEMPRE AVISAR AL SERVEI DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA CORRESPONENT.
TOS FERINA	FINS A 5 DIES DESPRÉS D'HAVER INICIAT EL TRACTAMENT ANTIBIÒTIC APROPIAT O 21 DIES DES DE L'INICI DE LA MALALTIA	MALALTIA PREVENIBLE AMB VACUNACIÓ.
GRIP	FINS ALMENYS 24 HORES SENSE FEBRE I QUE TOLERI L'ACTIVITAT GENERAL	

MALALTIES GASTROINTESTINALS

TIPUS DE MALALTIA	PERÍODE DE NO ASSISTÈNCIA	MESURES ADDICIONALS
DIARREES PER SALMONELLA	FINS 48 HORES DES DE LA DARRERA DEPOSICIÓ DIARREICA	SUPERVISIÓ DEL RENTAT DE MANS DELS INFANTS. EN PREESCOLARS, EL SERVEI DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA VALORARÀ LA NECESSITAT O NO D'OBTENIR ABANS DE LA READMISSIÓ DUES MOSTRES DE FEMTA NEGATIVES.
DIARREES PER SHIGELLA	FINS 48 HORES DES DE LA DARRERA DEPOSICIÓ DIARREICA	EN CAS DE S.BOYDII, S.DYSENTERIAE O S.FLEXNERI EN PREESCOLARS, FINS A L'OBTENCIÓ DE DUES MOSTRES DE FEMTA NEGATIVES (AMB UN INTERVAL DE 24 HORES).
DIARREES PER E.COLI O157:H7	FINS 48 HORES DES DE LA DARRERA DEPOSICIÓ DIARREICA	EN PREESCOLARS FINS A OBTENIR DUES MOSTRES DE FEMTA NEGATIVES (AMB UN INTERVAL DE 48 HORES).
DIARREES PER QUALSEVOL ALTRE MICROORGANISME	FINS 48 HORES DES DE LA DARRERA DEPOSICIÓ DIARREICA	

MALALTIES QUE CURSEN AMB ERUPCIÓ CUTÀNIA

TIPUS DE MALALTIA	PERÍODE DE NO ASSISTÈNCIA	MESURES ADDICIONALS
ESCARLATINA	FINS 24 HORES DESPRÉS D'INICIAR EL TRACTAMENT ANTIBIÒTIC	
ERITEMA INFECCIÓS (CINQUENA MALALTIA, MALALTIA DE LA BUFETADA)	NO CAL EXCLOURE L'INFANT DE L'ESCOLA	VALORAR RISC EN EMBARASSADES I INFANTS*
RUBÈOLA	FINS A 7 DIES DESPRÉS DE L'INICI DE L'EXANTEMA	VALORAR RISC EN EMBARASSADES I INFANTS*
HERPES SIMPLE (LABIAL)	NO ÉS NECESSÀRIA L'EXCLUSIÓ	EVITAR PETONS I CONTACTE AMB LES LESIONS HERPÈTIQUES
HERPES ZÒSTER	EXCLOURE NOMÉS SI LES VESÍCULES SUPUREN I NO ES PODEN COBRIR	PODEN CAUSAR VARICEL·LA EN AQUELLS QUE NO L'HAN PASSADA. ES CONTAGIA AMB CONTACTE DIRECTE I PROPER.
VARICEL·LA	FINS AL SISÈ DIA DESPRÉS DE L'APARICIÓ DE L'EXANTEMA, O ABANS SI LES LESIONS S'HAN ASSECAT I HAN FET Crosta.	
IMPETIGEN CONTAGIÓS	FINS A 48 HORES DESPRÉS DE L'INICI DEL TRACTAMENT ANTIBIÒTIC	
XARAMPIÓ	FINS A 4 DIES DESPRÉS DE L'INICI DE L'EXANTEMA	QUAN ES CONFIRMA UN CAS DE XARAMPIÓ, CAL EXCLOURE TOTS ELS INFANTS SUSCEPTIBLES NO VACUNATS, FINS QUE PUGUIN PRESENTAR UNA PROVA D'IMMUNITAT (VACUNACIÓ) O FINS QUE EL RISC DE CONTAGI HAGI PASSAT (FINS A 21 DIES DESPRÉS DE L'INICI DE L'EXANTEMA DEL DARRER CAS DE LA MALALTIA) VALORAR RISC EN EMBARASSADES I NENS I NENES*

ALTRES INFECCIONS I PARASITOSI

TIPUS DE MALALTIA	PERÍODE DE NO ASSISTÈNCIA	MESURES ADDICIONALS
MENINGITIS BACTERIANA (PNEUMOCÒCCICA, MENINGOCÒCCICA O PER HAEMOPHILUS INFLUENZAE)	FINS A QUE TOLERI L'ACTIVITAT GENERAL	MALALTIES PREVENIBLES AMB VACUNACIÓ. AVISAR AL SERVEI DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA PER IDENTIFICAR CONTACTES QUE REQUEREIXIN ANTIBIÒTIC.
MONONUCLEOSI INFECCIOSA	FINS QUE TOLERI L'ACTIVITAT GENERAL	
PAROTIDITIS (GALTERES)	FINS A 5 DIES DESPRÉS DE LA INFLAMACIÓ DE LES GLÀNDULES	ES POT PREVENIR AMB VACUNACIÓ.
HEPATITIS A	FINS A 7 DIES DESPRÉS DE L' INICI DELS SÍMPTOMES I FINS QUE TOLERI L'ACTIVITAT GENERAL	UNA BONA HIGIENE PERSONAL I AMBIENTAL MINIMITZEN LA PROPAGACIÓ DE LA MALALTIA.
PEDICULOSI (POLLS)	FINS A 24 HORES DESPRÉS QUE S'HAGI INICIAT TRACTAMENT. NO CAL EXCLOURE SI L'AFECTAT FA TRACTAMENT ADEQUAT.	EL TRACTAMENT NOMÉS ESTÀ RECOMANAT EN CASOS ON S'HAN VIST POLLS VIUS. COMPROVAR REGULARMENT L'EXISTÈNCIA DE POLLS AMB UNA PINTA.
TINYA	EXCLUSIÓ FINS QUE COMENCI EL TRACTAMENT. NO CAL EXCLOURE SI L'AFECTAT FA TRACTAMENT ADEQUAT	EL TRACTAMENT FARMACOLÒGIC ÉS IMPORTANT. TRACTAR ANIMALS DOMÈSTICS AMB SIMPTOMATOLOGIA.
SARNA/ESCABIOSI	POT TORNAR 1 DIA DESPRÉS D'INICIAR TRACTAMENT (ÉS A DIR UN COP ACABADA LA 1A TANDA).	TRACTAMENT EN 2 TANDES AMB UNA SETMANA DE DIFERÈNCIA.
BERRUGUES	NO CAL	LES BERRUGUES HAURIEN D'ESTAR COBERTES A PISCINES, GIMNÀS I VESTUARIS.
MOL·LUSC CONTAGIÓS	NO CAL EXCLOURE L'INFANT DE L'ESCOLA	EXCLOURE L'INFANT DE PRÀCTIQUES ESPORTIVES QUE IMPLIQUIN UN CONTACTE CUTANI ESTRET (LLUITA LLIURE O SIMILARS).

ALTRES ASPECTES HA TENIR EN COMPTE: ÉS MOLT IMPORTANT QUE L'ESCOLA TINGUI ELS TELÈFONS ACTUALITZATS DE LES FAMÍLIES. PER TAL DE PODER POSAR-SE EN CONTACTE EN QUALSEVOL MOMENT, LES FAMÍLIES SEMPRE HAN D'ESTAR LOCALITZABLES PER TAL DE PODER SOLUCIONAR QUALSEVOL DUBTE, EMERGÈNCIA , CONSULTA . IGUALMENT L'ESCOLA TAMBÉ HA D'ESTAR DISPONIBLE AL LLARG DE TOT L'HORARI ESCOLAR.

PER QUALSEVOL DUBTE PODEM TRUCAR A SANITAT RESPONT 061

COM HEM D'ACTUAR DAVANT DE QUALSEVOL ACCIDENT O MALALTIA A L'ESCOLA BRESSOL.

ACCIDENT/MALALTIA	QUÈ HEM DE FER	NO FER	SIGNES D'ALARMA	URGÈNCIA	TRUCAR A LA FAMÍLIA
COPS I CAIGUDES	VALORAR LA INTENSITAT DEL COP (D'ON HA CAIGUT, PÈRDUA DE CONEIXEMENT)		DESMAI, VÒMITS, SAGNAT PEL NAS O L'OÏDA, AMNÈSIA DE L'EPISODI, SI HI HA HAGUT PÈRDUA DE CONEIXEMENT, SÍMPTOMES NEUROLÒGICS (MAL DE CAP, MALA VISIÓ, PÈRDUA DE FORÇA..)	SI HI HA SIGNES D'ALARMA	SI
FERIDES	RENTAR LA FERIDA AMB AIGUA I SABÓ O SÈRUM FISIOLÒGIC. EN CAS D'HEMORRÀGIA PRESSIONAR SOBRE LA FERIDA FINS QUE DEIXI DE SAGNAR.	UTILITZAR IODE, COTÓ, AIGUA OXIGENADA, ALCOHOL O POMADA		SI ESCAU	SI ESCAU
CREMADES	NETEJAR AMB UN BON RAIG D'AIGUA, NO ASSECAR.	DESENGANXAR LA ROBA, PETAR BUTLLOFES, APLICAR POMADES O PASTA DE DENTS, APLICAR GEL		SEMPRE EN CREMADES QUÍMIQUES O PER ELECTROCUCIÓ.	SI
HEMORRÀGIES NAS	FER COMPRESSIÓ AL NAS SOBRE EL COSTAT QUE SAGNA I INCLINAR EL CAP ENDAVANT (10MIN). ES POT APLICAR GEL COBERT AMB UN DRAP I FER PRESSIÓ	AJEURE L'INFANT		SI NO S'ATURA	SI NO S'ATURA
PICADES	APLICAR AIGUA FREDA O GEL	POSAR POMADES, APRETAR O RASCAR	REACCIÓ AL·LÈRGICA	SI ESCAU	SI ESCAU
AL·LÈRGIES	VALORAR DIFICULTAT RESPIRATÒRIA, INFLOR DE LA CARAI/O COLL, DIFICULTAT PER EMPASSAR SALIVA	OFERIR MENJAR O LÍQUIDS	DIFICULTAT RESPIRATÒRIA EDEMA FACIAL	SI ESCAU	SI ESCAU
ENNUEGAMENT	MANIOBRES ESPECÍFIQUES DE DESTRUCCIÓ DE LA VIA AÈRIA	COL·LOCAR L'INFANT AJAGUT, DEIXAR-LO SOL, OFERIR ALIMENTS I/O LÍQUIDS	UN ENNUEGAMENT ÉS SEMPRE UNA URGÈNCIA MENTRE NO ES RESOLGUI	SI	SI
FEBRE	RETIRAR LA ROBA D'ABRIC, ADMINISTRAR LÍQUIDS, COMPRESSES D'AIGUA FREDA ALS CANELL I AL FRONT	ADMINISTRAR ANTITÈRMIC SENSE AUTORITZACIÓ	CONVULSIONS FEBRILS	SI HI HA CONVULSIONS	SI
DIARREA	OFERIR LÍQUIDS (AIGUA)				SI
VÒMITS	OFERIR AIGUA A MOLT PETITES QUANTITATS		VÒMITS COPIOSOS I PERSISTENTS		SI
CONJUNTIVITIS					SI
VARICEL·LA					SI
PARASITOSI (POLLS)					SI



FONTS:

- TALLER DE PRIMERS AUXILIS , FORMACIÓ SANT JOAN DE DÉU
 - CRITERIS DE NO ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNAT A L'ESCOLA O LLAR D'INFANTS DURANT UN PERÍODE DE TEMPS DETERMINAT A CAUSA DE MALALTIES TRANSMISSIBLES. AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT.
 - PROTOCOL DE SALUT ESCOLA MONTAGUT.
- 